

Как уберечь ребенка от инфицирования и заболевания туберкулезом?

- ❖ Всем членам семьи будущего новорожденного ребенка следует обследовать на туберкулез методом флюорографии.
- ❖ Родителям: ни в коем случае не отказываться от обязательной прививки БЦЖ в родильном доме и от ревакцинации в 7 лет (если ребенок не инфицирован туберкулезом)!
- ❖ Ежегодно детям с одного года до 8-ми лет ставится туберкулиновая проба с 2 ТЕ, с 8-лет до 17 – проба диаскинест.
- ❖ При выявлении впервые положительной реакции с 5 мм и более (вираж) и при нарастании аллергии до гиперergicической (17 мм и более) или при положительной пробе диаскинест дети и подростки срочно направляются к детскому врачу-фтизиатру.
- ❖ После обследования при отсутствии признаков болезни проводится строго контролируемый курс химиопрофилактики туберкулеза.
- ❖ Семья такого ребенка или подростка обследуется в целях выявления источника инфицирования детей туберкулезом.
- ❖ Не инфицированные туберкулезом дети повторно прививаются вакциной БЦЖ в 7-летнем возрасте.



- ❖ Если ребенок находится в тесном семейном контакте с больным туберкулезом:
- ❖ Родителям с детьми необходимо регулярно посещать детского врача-фтизиатра
- ❖ Новорожденного ребенка обязательно нужно привить вакциной БЦЖ (БЦЖ-М) и, на время выработки иммунитета против туберкулеза разобщить с больным на два месяца.
- ❖ Не допускать посещения детьми комнаты больного-бактериовыделителя
- ❖ Ребенок должен обследоваться на туберкулез каждые 3-6 месяцев реакцией Манту с 2 ТЕ, при необходимости – более глубокое обследование (диаскинест, рентгенография, компьютерная ФЛГ, анализы).
- ❖ Получать строго контролируемое профилактическое лечение противотуберкулезными препаратами по назначению врача.
- ❖ Дети на период изоляции от больного и для проведения химиопрофилактики направляются в детские санаторные учреждения.

**ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ ИНФИЦИРОВАНИЯ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
МОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ:**

- ВАКЦИНАЦИЯ БЦЖ (БЦЖ-М),
- РЕГУЛЯРНАЯ ОЦЕНКА РЕАКЦИИ НА ВВЕДЕНИЕ ТУБЕРКУЛИНА,
- ИЗОЛЯЦИЯ ОТ БОЛЬНОГО,
- КОНТРОЛИРУЕМАЯ ХИМИОПРОФИЛАКТИКА В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРНОГО ИЛИ САНATORНОГО ДЕТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ